

Anti^{ax}®

CON MAGALDRATO ANTIFLATULENTO



FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto, puede necesitar leerlo nuevamente.

¿CUÁL ES LA COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO?

Cada **comprimido masticable** de ANTIAX® contiene:

Magaldrato	480 mg
Simeticona	100 mg

Excipientes: sacarosa, sabor menta, estearato magnesio, manitol, sabor imitación chicle, sacarina.

Cada 100 ml de ANTIAX® **suspensión** contienen:

Magaldrato (complejo de Hidróxido de Aluminio y Magnesio)	9,6 g
Simeticona	2,0 g

Excipientes: ácido cítrico, celulosa microcristalina, carmelosa sódica, carbomer, esencia limón, esencia menta, hidroxietilcelulosa, glicirricinato de amonio, metilparabeno, propilparabeno, sacarina, sorbitol, agua purificada.

Cada 5 ml (1 cucharadita) de ANTIAX® **suspensión** contiene:

Magaldrato (complejo de Hidróxido de Aluminio y Magnesio)	480 mg
Simeticona	100 mg

Excipientes c.s.

¿PARA QUÉ SE USA ANTIAX®?

ANTIAX® es un antiácido - antiflatulento; indicado para el tratamiento de la dispepsia, flatulencia y acidez estomacal.

¿CUÁL ES LA ACCIÓN TERAPEÚTICA DE ESTE MEDICAMENTO?

Antiácido - antiflatulento.

¿CUÁNDO NO USAR ANTIAX®?

No tome ANTIAX® si usted:

Si es alérgico (hipersensible) a cualquiera de los componentes de la fórmula.

Si padece o sospecha de obstrucción o perforación intestinal.

Si padece de dolor abdominal, vómito o fiebre.

No administrar a menores de 12 años.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Ud. debe comunicar a su médico si alguna vez ha presentado una reacción alérgica a este medicamento o a alguna otra sustancia, ya sea alimento, preservantes, colorantes u otros saborizantes. Si presenta reacción alérgica con este medicamento debe discontinuar su uso y acudir a su médico.

Si los síntomas empeoran o persisten por más de 7 días, o recurren, acuda a su médico, ANTIAX® podría enmascarar los síntomas de enfermedades más graves como son las úlceras o sangrados intestinales.

Podría causar diarrea y /o deshidratación. No exceda de la dosis máxima diaria.

ANTIAX® comprimidos contiene azúcar, precaución en personas diabéticas.

Embarazo: Consulte a su médico antes de utilizar cualquier medicamento. La probabilidad de riesgo de efectos adversos en el feto es baja.

Lactancia: La información es insuficiente para determinar el riesgo infantil, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento durante la lactancia.

¿CÓMO DEBO TOMAR ANTIAX®?

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiado a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada en adultos y niños mayores de 12 años es:

Comprimidos Masticables: 1 a 2 comprimidos después de las principales comidas.

Suspensión oral: 1 a 2 cucharaditas después de las principales comidas.

¿QUÉ DEBO HACER SI ANTES DE INICIAR EL TRATAMIENTO PADEZCO DE OTRAS ENFERMEDADES?

El efecto de este medicamento puede modificarse por la presencia de una enfermedad, dando lugar a efectos no deseados, algunos de ellos severos. Debe informarle a su médico si padece de alguna enfermedad. Dígame a su médico todas sus condiciones médicas, especialmente si usted tiene: úlceras, sangrados intestinales, daño renal (especialmente en aquellos que se encuentran en etapas avanzadas de la enfermedad).

¿QUÉ INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS PRESENTA ESTE MEDICAMENTO?

El efecto de un medicamento puede modificarse al ser administrado junto a otros, por lo tanto Ud. debe comunicar a su médico todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta antes de usar este fármaco. Se podrían presentar interacciones medicamentosas si se administra concomitantemente ANTIAX® junto con: penicilamina, cloroquina, clorpromazina, cimetidina, ciclosporinas, rosuvastatina, bifosfonatos, antivirales y retrovirales (como amprenavir, atazanavir, delavirdina, etc.), ketoconazol, itraconazol, atenolol, captopril, propranolol, digitálicos, micofenolato, tacrolimus, dasatinib, erlotinib, las sales de hierro, dicumarol, glipizida, gliburida, ácido acetilsalicílico, alopurinol, efedrina, litio, pseudoefedrina, quinidina, algunos antibióticos como las tetraciclinas, cefalosporinas, macrólidos y quinolonas.

¿CUÁLES SON LOS POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS DE ANTIAX®?

Los efectos adversos de ANTIAX® son generalmente leves y transitorios. Especialmente a dosis elevadas, puede producir estreñimiento, náuseas, vómito y diarrea. Sin embargo, a la dosis recomendada son muy raras tales manifestaciones.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de la combinación magaldrato - simeticona. Hable con su médico o farmacéutico si usted tiene alguna pregunta acerca de los efectos secundarios.

SOBREDOSIFICACIÓN - TRATAMIENTO

La intoxicación aguda por magaldrato (componente antiácido de ANTIAX®) es muy improbable, ya que el aluminio y el magnesio se absorben en escasa medida.

Los principales signos de sobredosificación en pacientes con tratamientos muy prolongados, a dosis altas y con deterioro de la función renal, son osteomalacia, osteoporosis, agravamiento de demencia o encefalopatía. También puede producirse hiporreflexia y debilidad muscular y en casos graves, puede aparecer hipotensión, bradicardia entre otros. En caso de ocurrir una sobredosificación concorra al centro asistencial más cercano, portando el envase de este medicamento, para poder implementar las medidas de soporte necesarias.

¿CÓMO ALMACENAR?

No dejar al alcance de los niños.

Almacenar a la temperatura indicada en el envase.

Mantener en su envase original protegido del calor, la luz, y humedad.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin antes consultar con su médico.

No recomiende este medicamento a otra persona.



Elaborado y distribuido en Chile por
Laboratorios SAVAL S.A.
Panamericana Norte 4.600
Santiago
www.saval.cl